INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA

Acetato de Buserelina Synkro Xy

Principio activo

Acetato de Buserelina 4,2 µg



Laboratorio

SYNKRO XY

Categoria

HORMONAL

Descripción

Hormona Gonádotrofina. Análogo sintético de GnRH, liberadora de FSH y LH.

Indicaciones

Acetato de Buserelina Synkro Xy está indicado en casos de reducida fertilidad por disminución ovárica, para inducir la ovulación y para mejorar la tasa de concepción.

En vacas:

- Problemas de quistes foliculares.
- Anestro, aciclia, ovulación retardada o atresia folicular.
- Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial y también después de la sincronización del
- celo.
- Incremento de la tasa de concepción.
- Prevención de problemas en la fertilidad por inducción prematura del ciclo post parto.

En yeguas:

- Quistes ováricos e inducción de ovulación. Otros trastornos ováricos con o sin presencia de celo prolongado
- o permanente.
- Celo prolongado o permanente.
- Anestro o aciclia.
- En inducción de la ovulación ayuda a fijar el tiempo de la ovulación y determinar mejor el tiempo de la monta.
- Incremento de la tasa de concepción.

En conejos:

- Inducción de la ovulación.
- Incremento de la tasa de concepción en la inseminación post parto.

Especies indicadas

El producto se destina a vacas, yeguas y conejas.

Dosificacion y vias de administracion:

INVERSIONES GENERALES BRIVET SRL

av. America Norte 1635 Urb. Las Quintanas
La Libertad - Trujillo
(51) 932219044 / (51) 979232073
brivet@brivetperu.com
brivetperu.com

FICHA TÉCNICA

Dosificación:

En vacas:

- Quistes foliculares.....5 ml]
- Anestro o aciclia.....5 ml
- Ovulación retardada o atresia folicular.....2,5 ml
- Incremento del índice de concepción en la inseminación artificial o natural y/o después de la sincronización del celo.....2,5 ml
- Prevención de problemas en la fecundidad por inducción prematura del ciclo post parto....5 ml

En yeguas:

- Quistes ováricos e inducción de ovulación.
- Otros trastornos ováricos con o sin presencia de celo prolongado o permanente: 10 ml
- Celo prolongado o permanente: 10 ml
- Anestro o aciclia: 5 ml cada 24 horas durante 2 días.
- En inducción de la ovulación ayuda a fijar el tiempo de la ovulación y determinar mejor el tiempo de la monta: 10 ml
- Incremento de la tasa de concepción: 10 ml

En conejos:

- Inducción de la ovulación: 0,2 ml
- Incremento de la tasa de concepción en la inseminación post parto: 0,2 ml

---

Vías de administración:

Se recomienda aplicar por vía intramuscular, pero también puede usarse la vía subcutánea o endovenosa

Contraindicaciones y limitaciones de uso

No posee contraindicaciones a las dosis recomendadas.

Presentación

Frasco ampolla con un contenido neto de 20 ml.